



Paloma bravía (Columba livia)



- •Medidas: 30-35 cm de longitud.
- •Obispillo blanco.
- •Ancestro de las palomas domésticas con las que hibrida.
- Sedentaria



© En algunas ciudades puede llegar a ser una plaga. Es huésped de numerosos parásitos y portadora de Salmonella.

Paloma torcaz (Columba palumbus)

- •Medidas: 40 cm de longitud.
- •Manchas blancas en el cuello.
- Nidifica en árboles
- Visita cultivos
- Muy común
- •Especie cinegética



Las palomas utilizan su pico puntiagudo a modo de pajita para beber.



Tórtola turca (Streptopelia decaocto)



- •Medidas: 32 cm de longitud.
- •Mayor y más colilarga que la europea
- Poco común pero en rápida expansión
- Le atraen las coníferas
- Molinos de pienso y cebaderos para comer



Es una especie introducida.

Gorrión común (Passer domesticus)

- •Medidas: 15 cm de longitud.
- Vulgar y antropófilo
- Se mueve a saltos
- •Anida bajo tejas o en huecos de edificios o árboles, nidos de avión común, en nidos de cigüeñas...



 Es comensal con el ser humano desde el origen de la agricultura, hace unos 12.000-14.000 años.



En León, se le conoce también como Pardal.

Gorrión Molinero (Passer montanus)

- •Medidas: 13 cm de longitud.
- •No hay dimorfismo sexual.
- •No presenta "boina" gris, lo que le diferencia del gorrión común.
- Es menos confiado que el gorrión común y menos urbano.



Los gorriones toman baños de polvo para aliviar los picores de parásitos.



Lavandera blanca (Motacilla alba)



- •Medidas: 18 cm de longitud.
- Nuca negra en machos y gris en hembras
- •Siembras, barbechos, común en zonas de agua.
- Muy común



Normalmente, se observa en el suelo, mientras camina agitando la cola de arriba abajo.

Petirrojo (Erithacus rubecula)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- Come en el suelo moviéndose a saltos
- Posaderos bajos
- Solitario
- Insectos



Fácilmente observable en parques y jardines.



Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)



- •Medidas: 14 cm de longitud.
- •Las hembras y los jóvenes son de color gris marronáceo, pero siempre tienen la cola rojiza.
- Canto desde posadero alto
- Caza desde perchas bajas o saltos por el suelo
- •Se posa erguido y agita la cola



Mirlo común (Turdus merula)

- •Medidas: 25 cm de longitud.
- Canto aflautado
- •Anda a saltos, parándose erguido
- Cola larga
- Patas oscuras



El pico color amarillo anaranjado de los machos sirve para atraer a las hembras.



Estornino pinto (Sturnus vulgaris)



- •Medidas: 21 cm de longitud.
- •Plumaje negro con reflejos púrpura, bronce y verde.
- •Plumas cortas en garganta y píleo.
- •Cola corta
- Muy gregario
- Abundante y en aumento



Es capaz de imitar sonidos domésticos (ej. móviles) y repetir palabras.

Estornino negro (Sturnus unicolor)



Los estorninos se conocen, en la provincia de León, como tordos.

- •Medidas: 21 cm de longitud.
- Patas rojizas
- Cola corta
- Camina
- Muy gregario
- Cultivos y pastizales
- Abundante y en aumento



Difícil de diferenciar del estornino pinto, a veces formando bandos mixtos.

Urraca (Pica pica)

- •Medidas: 45 cm de longitud.
- •Camina o salta levantando la cola frecuentemente
- •Solitaria, en parejas o en pequeños grupos
- Alimentación variada
- Sedentaria
- •Muy común, en expansión



En algunas zonas de León, la llaman Pega.



Graja (Corvus frugilegus)



- •Medidas: 45 cm de longitud.
- Localizada
- Calzas emplumadas
- Muy gregaria
- Alimentación variada
- •En la Península Ibérica sólo nidifica en la provincia de León.



Se diferencia de otros córvidos por su pico largo y grisáceo.

Grajilla (Corvus monedula)

- •Medidas: 32 cm de longitud
- Gregaria
- Alimentación variada
- •Cortados, ruinas, huecos de árboles...



- Se diferencia de otros córvidos por la nuca gris y el ojo gris azulado casi blanco.
- La "Milana Bonita" de Paco Rabal en Los Santos Inocentes es una Grajilla, adiestrada por Aurelio Pérez.




Cernícalo vulgar (Falco tinunculus)



- •Medidas: 30-35 cm de longitud.
- Colilargo
- •Se cierne a menudo
- •Caza en cultivos, pastizales, matorrales, cunetas
- Muy común





Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

- •Medidas: 100-110 cm de longitud.
- •En el agua y en terrenos secos
- Alimentación variada
- Grandes nidos
- •Vulnerable pero en aumento.



Crotorea (sonido que hace con el pico).





Vencejo común (Apus apus)



- •Medidas: 17 cm de longitud.
- •Gregario, frecuentemente en grupos apretados y estridentes
- •Amplios movimientos de alimentación
- •Colonias con nidos en huecos y grietas de edificios; a veces en cantiles o árboles




Puede dormir en el aire.

Golondrina común (Hirundo rustica)

- •Medidas: 18 cm de longitud.
- Caza a muy baja altura
- •Se percha en cables y vallas
- Gregaria
- Grandes dormideros en carrizales
- También nidos en casas viejas



 Existen varios refranes que aluden a esta especie. Por ejemplo, "Una golondrina no hace verano".



Avión común (Delichon urbica)



- Medidas: 14 cm de longitud.
- •Nidos en aleros y balcones
- •Muy gregario, anida en colonias, a veces de docenas o cientos de parejas
- Se posa en cables
- Suele volar a > altura q golondrinas



El obispillo blanco puede ayudarnos a diferenciarlos de las golondrinas en vuelo.



Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

- •Medidas: 45-55 cm de longitud.
- Alas largas, estrechas y rectas.
- Cola larga.
- Macho tricolor.
- •Hembra y juveniles color chocolate con cabeza crema.
- •Anida en carrizos, lagunas, embalses, arroyos...
- •Come roedores, conejos, aves acuáticas...
- Vulnerable.



Se puede ver a los aguiluchos volando sobre un rastrojo o un páramo a uno o dos metros del suelo, con las alas y la cola muy largas.



Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)



- Medidas: 46-51 cm de longitud.
- Con golas y penachos nupciales.
- Lagos, lagunas, embalses...
 sobre todo ricas en pesca y con vegetación palustre donde anidar.



Ante un peligro se hunden en el agua asomando solamente el pico y los ojos.



Garza real (Ardea cinerea)

- •Medidas: 90-100 cm de longitud.
- Cuello replegado al volar
- •Ríos, lagunas, embalses, arrozales, salinas, costas...



Anida en lo alto de los árboles, escondida entre las copas.





Gallineta común (Gallinula chloropus)



- •Medidas: 32 cm de longitud.
- Pico rojo y gualda.
- •Ríos, arroyos, lagunas, parques...
- Omnívora.
- Común.



También se llama Polla de agua.

Focha común (Fulica atra)

- •Medidas: 38 cm de longitud.
- •Pico y escudete blancos.
- •Ríos lentos, lagunas, embalses...



Tiene lóbulos escamosos en los dedos de las patas que le facilitan la natación y le permiten moverse en terrenos pantanosos.



Martín pescador (Alcedo atthis)



- Medidas: 17 cm de longitud.
- •Ríos y arroyos claros con vegetación a la orilla y taludes donde excavar el nido
- Se zambulle para pescar, frecuentemente tras cernirse
- Evita zonas de montaña




Sus alas triangulares le ayudan a salir fácilmente del agua después de zambullirse.

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

- •Medidas: 19 cm de longitud.
- Lavandera más esbelta y colilarga
- •Ríos y arroyos de corriente rápida
- Anida entre rocas o en puentes, presas, molinos







Mirlo acuático (Cinclus cinclus)



- Medidas: 18 cm de longitud.
- Sigue el río en vuelo bajo y rápido
- •Se posa en orillas y piedras
- Aguas rápidas hasta más de 2500 m de altitud.
- Nidos entre rocas,
 frecuentemente bajo cascadas



Es un buen indicador ecológico ya que sólo se encuentra en aguas limpias poco o nada contaminadas donde encuentra su alimento, las larvas de insectos acuáticos.

Chochín (Troglodytes troglodytes)

- •Medidas: 10 cm de longitud.
- Larga lista superciliar
- •Motas blancas en las coberteras medianas, ausentes en juveniles.



Tiene una buena capacidad reproductiva que le hace recuperarse con relativa facilidad de los daños que el frío invierno provoca en sus poblaciones.



Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)



- •Medidas: 13-14 cm de longitud.
- Vegetación de orilla
- Vegetación arbustiva densa en ríos, arroyos, charcas, depresiones húmedas...
- Sedentario
- Muy común



Más fácil de escuchar que de ver.

Mito (Aegithalus caudatus)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- Cola muy larga
- Confiado y acrobático
- Construye nido muy elaborado, en bolsa con entrada lateral
- Insectívoro
- Sedentario
- •Común





Pájaro moscón (Remiz pendulinus)



- •Medidas: 11 cm de longitud.
- •Poco común, aunque en aumento
- •Pico cónico, puntiagudo
- •Nido colgado en alamedas o saucedas
- Visita carrizos y espadañas





Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula)

- Medidas: 16 cm de longitud.
- Macho muy llamativo.
- •En parejas o grupos reducidos.
- •Bosques húmedos.





Ánade azulón (Anas platyrhynchos)

- •Medidas: 50-65 cm de longitud.
- Antecesor de los patos domésticos (hibridación)
- Todo tipo de humedales
- •Omnívoro. Come en arrozales, dehesas, praderas, siembras







Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)



- Medidas: 35-40 cm de longitud.
- Patas y picos muy largos.
- •Inspecciona con el pico el fondo limoso.
- Come insectos y otros invertebrados.
- Semiacuática.
- Aguas dulces o salobres.



Pico largo, delgado y recto.

Avoceta común (Recurvirostra avosetta)

- •Medidas: 42-45 cm de longitud.
- Patas y picos muy largos.
- •Barre la superficie del agua con el pico, moviendo la cabeza de un lado a otro.
- ·Semiacuática.
- •Lagunas, marismas...
- •Ave de paso.
- •Rara.





Pico largo, delgado y recurvado hacia arriba.

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)



- Medidas: 15 cm de longitud.
- •Parecido al chorlitejo grande pero éste es principalmente costero.
- Insectívoro.
- •Ríos, charcas, lagunas... casi siempre en aguas dulces.



Es un excelente nadador.

Oropéndola (Oriolus oriolus)

- •Medidas: 24 cm de longitud.
- Nido colgante en una horquilla
- Orugas, escarabajos, bayas, higos...



Es la única oropéndola de Europa.



Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)



- •Medidas: 16-17 cm de longitud.
- Muy escondidizo
- Monte bajo algo húmedo, matorral alto y denso, espesuras riparias...
- Muy común
- Falta en la alta montaña



© Cuando alguien canta melodiosamente se dice que "canta como un ruiseñor".

Papamoscas gris (Muscicapa striata)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- Pardo grisáceo.
- •Frente plana, píleo levantado y pico grande y ancho.
- •Cola larga y alas apuntadas.
- •Sotos, huertos, jardines...
- Insectívoro.



Acostumbra a capturar su presa y volver al punto de partida.



Mosquitero ibérico (Phylloscopus brehmii)



- •Medidas: 11 cm de longitud.
- •Bosques y matorrales frescos
- •Cuanto más al norte más común

Difícil de distinguir del mosquitero común.



Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

- Medidas: 11 cm de longitud.
- •Bosques y matorrales húmedos, montanos y en sotos fluviales



Es fácil confundirlo con el mosquitero papialbo.




Garza imperial (Ardea purpurea)

- •Medidas: 75-90 cm de longitud.
- Cuello replegado al volar
- Ligada a humedales extensos, a veces a grandes ríos, se aparta poco de la vegetación.
- •Anida en colonias dentro de la vegetación palustre (carrizos, eneas...).
- Vulnerable.



Las garzas pescan a la espera, permanecen inmóviles hasta que el pez se encuentra al alcance de su pico.



Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)



- Único en aguas interiores
- •Medidas: 80-100 cm de longitud.
- Cuerpo aerodinámico.
- •Cuello ligeramente encogido en vuelo
- •Embalses, ríos, estuarios, deltas...
- Duerme en rocas y árboles



Tiene una propulsión poderosa al bucear para atrapar peces.

Avefría (Vanellus vanellus)

- •Medidas: 28-31 cm de longitud.
- Alas redondeadas.
- Hembra con cresta más corta.
- •Gregaria.
- Lagunas, embalses, pastizales, prados con juncos...



Busca lombrices en campos y charcas.



Agachadiza común (Gallinago gallinago)

- •Medidas: 25 cm de longitud.
- •Pico casi dos veces la cabeza.
- Despega de improviso y huye haciendo veloces zigzag.
- •Áreas encharcadas de agua dulce.




La disposición de los ojos le permite ver todo lo que hay a su alrededor y por encima de ella sin mover la cabeza.





Azor común (Accipiter gentilis)



- •Medidas: 50-55 cm de longitud.
- •Iris amarillo-naranja.
- ·Alas anchas.
- Cola larga y redondeada
- •Hembra bastante más grande que el macho.
- •Pinares, hayedos, robledales...
- •Caza palomas, zorzales, ardilla, conejos...



Tiene un reborde sobre cada ojo, que le proporciona sombra y protección.

Gavilán común (Accipiter nisus)



- •Medidas: 30-35 cm de longitud.
- •Iris amarillo-naranja.
- •Alas cortas y redondeadas.
- •Cola larga y rectangular.
- •Hembra bastante más grande que el macho.
- •Bosques y bosquetes.
- Caza pájaros.



Los pesticidas empobrecen la cáscara de los huevos y provocan frecuentes roturas durante la fecundación (esto ocurre en varias especies de aves rapaces).

Cárabo común (Strix aluco)



- Medidas: 40 cm de longitud.
- Rechoncho, talla media, sin "orejas", cabeza grande y redondeada.
- Ojos negros.
- Alas anchas y cortas.
- Color pardo-rojizo a leonado o grisáceo.
- Bosques maduros de coníferas o frondosas.
- Anida en agujeros de árboles.
- Caza desde una percha, localizando ratones, topillos, pájaros...



El borde desflechado de las plumas de las rapaces nocturnas reduce las corrientes de aire y amortigua el ruido de su vuelo.

Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus)

- •Medidas: 55-90 cm de longitud.
- Endemismo.
- •Es el urogallo más pequeño.
- Tarsos cubiertos de plumas.
- •Dimorfismo sexual muy acusado.
- •Suelen encontrarse en bosques de coníferas, pero esta especie también se encuentra en bosques caducifolios.
- •Los pollos son insectívoros pero el adulto se alimenta de arándanos, brotes de pinos, acebo...
- •Se encuentra en Peligro de extinción.



El ritual de cortejo lo realizan en unos lugares llamados cantaderos.



Pito negro (Dryocopus martius)

- •Medidas: 45 cm de longitud.
- •Negro con el píleo carmín.
- •Pico e iris blanquecino.
- •Reclamo durante el vuelo.
- •Vuelo con batidos irregulares y trayectoria recta.
- •Bosques de montaña (haya, pino, robles...).
- •En León, sólo se encuentra en la Cordillera Cantábrica.
- •Raro.





Los pájaros carpinteros tienen cuatro dedos opuestos dos a dos para agarrarse sólidamente a los troncos de los árboles por los que trepan.

Pico picapinos (Dendrocopos major)




- •Medidas: 23 cm de longitud.
- •Píleo negro con mancha posterior roja en machos, todo negro en hembras y todo rojo en juveniles.
- •Tamborilea rápidamente en las ramas secas de los árboles.
- •Todo tipo de bosques y arboledas de ribera.
- •Come insectos y piñones, incluso nueces.
- •Frecuente en comarcas forestales.



Los picapinos utilizan su cola como apoyo cuando trepa a los árboles y cuando pican la madera.

Arrendajo (Garrulus glandarius)



- •Medidas: 34 cm de longitud.
- •Principalmente en robledales.
- Bastante escondidizo.
- •Almacena bellotas para el invierno.



- Se revuelca en hormigueros porque el ácido fórmico que liberan estos insectos aleja a los parásitos.
- Dicen que es "el chivato del bosque" ya que es el primero en detectar la presencia humana y avisar al resto de fauna.

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- •Común
- •Bosques con matorral.







Zorzal común (Turdus philomelos)

- •Medidas: 22 cm de longitud.
- •Bosques, sotos, arboladas frescas, matorrales mediterráneos...
- •Canto frecuentemente desde lo alto de un árbol
- •Come en el suelo cerca de abrigos



Rompe caracoles contra las piedras.



Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)



- •Medidas: 9 cm de longitud.
- •Lista central, naranja en machos y amarilla en hembras.
- •Pinares, hayedos, robledales, carrascales, enebrales, sotos...



Los reyezuelos son las aves más pequeñas de Europa.

Reyezuelo listado (Regulus regulus)

- •Medidas: 9 cm de longitud.
- Lista superciliar blanca y ocular oscura.
- •Lista pileal eréctil, naranja en machos y amarilla en hembras.
- •Pinares, encinares, hayedos, robledales...





Agateador común (Certhia brachydactyla)



La cola es larga y de plumas ásperas y duras para ayudarle a trepar por los troncos de los árboles.

- •Medidas: 13 cm de longitud.
- •Pequeño, arratonado, de pico fino y algo curvo.
- •Asciende los troncos en espiral.
- •Todo tipo de bosques, sotos, dehesas...
- Anida en grietas y huecos de árboles y muros.



Trepador azul (Sitta europaea)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- •Gruesa lista ocular negra.
- •Pico grande, cola muy corta.
- •Bosques y arboledas.





Es frecuente encontrarlo caminando cabeza abajo por los troncos.

Carbonero común (Parus major)



- Medidas: 14 cm de longitud.
- Parte inferior amarilla.
- •Cabeza negra y blanca, con una larga corbata negra (más ancha en los machos).
- •Todo tipo de terrenos arbolados (bosques, dehesas, sotos...).



En algunas zonas le Chichipán por el sonido que emite, ya que parece que repite una y otra vez: "chichipán-chichipán".

Carbonero palustre (Parus palustris)

- •Medidas: 12 cm de longitud.
- •Capirote y babero negros.
- •Babero pequeño.
- •Bosques, principalmente, hayedos y robledales.





No tiene mancha blanca en la parte posterior de la cabeza y tiene un babero negro pequeño, al contrario que el Carbonero garrapinos.

Carbonero garrapinos (Parus ater)



- •Medidas: 11 cm de longitud.
- •Pileo negro con mancha blanca en la nuca.
- •Babero negro amplio, sin corbata.
- •Bosques, sobre todo, pinares.



Realizan dos puestas al año, de 6 a 10 huevos cada una.

Herrerillo común (Parus caeruleus)

- •Medidas: 11 cm de longitud.
- Amarillo por debajo.
- •Píleo, alas y cola azules.
- •Bosques y dehesas.



Sacude la vegetación en busca de insectos.



Herrerillo capuchino (Parus cristatus)



- •Medidas: 11 cm de longitud.
- •Tiene cresta replegable.
- •Bosques, principalmente, coníferas.
- •Insectívoro.



Los herrerillos y carboneros son una ayuda eficaz en la lucha biológica contra las plagas agrícolas y forestales.

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)

- •Medidas: 18 cm de longitud.
- Cabeza gruesa y cola corta.
- •Hembra sin garganta negra.
- Vuelo fuerte.
- •Bosques y bosquetes de diverso tipo (haya, olmo, escaramujo...).



Es capaz de cascar los huesos de las cerezas.



Piquituerto común (Loxia curvirostra)



- •Medidas: 16 cm de longitud.
- •Pico peculiar de mandíbulas cruzadas.
- •Bosques y repoblaciones de coníferas.



Pico especializado en extraer semillas de las piñas.

Pinzón común (Fringilla coelebs)



 El pinzón tiene una dieta insectívora en verano y granívora en invierno.

- •Medidas: 15 cm de longitud.
- Macho con vivo colorido.
- •Todo tipo de bosques y terrenos con árboles.
- •Suele alimentarse en el suelo.





Águila culebrera (Circaetus gallicus)



- •Medidas: 62-67 cm de longitud.
- •Grande y muy blanca.
- Cabeza ancha.
- Cola recta.
- Anida en bosques y bosquetes.
- •Caza serpientes en laderas con matorral bajo, claros y eriales.



Las aves rapaces cazan principalmente guiadas por su vista y son famosas por su aguda visión, se estima que al menos pueden ver 4 veces mejor que el ser humano que les permite detectar una presa desde gran distancia.

Águila calzada (Hieraaetus pennatus)


- Medidas: 45-50 cm de longitud.
- Águila pequeña.
- Hay dos morfos:
 - 1. Claro (la mayoría).
 - 2. Oscuro o chocolate.
- Cola pálida y recta.
- Pinares, encinares, dehesas, sotos...
- Come gazapos, aves, lagartos...



Las patas de las aves rapaces no están adaptadas para caminar.



Halcón abejero (Pernis apivorus)



- Medidas: 52-60 cm de longitud.
- Vuelo decidido.
- Migra en bandos.
- Hayedos, robledales, pinares, prados y cultivos.
- Come gazapos, aves, lagartos...



Desentierra nidos de avispas y abejorros.

Búho real (Bubo bubo)



- Medidas: 60-70 cm de longitud.
- Largas "orejas".
- Grandes ojos anaranjados.
- Alas amplias y redondeadas.
- Garras poderosas.
- Vuelo silencioso.
- Promontorios rocosos en bosques.
- Come principalmente conejos.
- Raro.



El gran duque cuando es sorprendido infla su plumaje para aparentar un tamaño mayor.

Búho chico (Asio otus)



Pasa el día escondido entre las ramas.

- Medidas: 35 cm de longitud.
- Largas "orejas".
- Grandes ojos naranjas.
- Principalmente en bosques de coníferas.
- Ocupa nidos de córvidos.
- Caza ratones, topillos, pájaros...



Autillo europeo (Otus scops)

- Medidas: 20 cm de longitud.
- Es el más pequeño de nuestros búhos.
- Presenta copetes auriculares ("orejas").
- Hay dos morfos, uno gris y otro pardo.
- Canto parecido al del sapo partero.
- Sotos fluviales, bosquetes, dehesas, huertos, parques...
- Anida en agujeros de árboles, nidos de córvidos...
- Insectívoro.







Las aves rapaces nocturnas pueden cazar en la oscuridad gracias a la agudeza de su oído. Los oídos están a distintas alturas (audición "binaural").

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)

- •Medidas: 11,5 cm de longitud.
- Partes inferiores blancas.
- •Obispillo amarillo.
- •Bosques no muy húmedos, melojos, quejigos, encinas, pinos, etc.



Es frecuente diferenciar a los mosquiteros por su canto.





Becada (Scolopax rusticola)

- •También se llama Chocha perdiz.
- •Medidas: 35 cm de longitud.
- •Pico casi dos veces la cabeza.
- Alas cortas y anchas.
- •Despega con un ruidoso aleteo.
- •Come de noche.



Su pico es una "sonda" para buscar gusanos e insectos en la hojarasca del suelo.





Lúgano (Carduelis spinus)



7

- Medidas: 12 cm de longitud.
- •Pequeño y verde-amarillento.
- •Marcas amarillas en alas, obispillo y lados de la cola.
- •Pico fino.
- Cola corta.
- •Machos con píleo y mentón negros.
- •Frecuenta sotos de alisos o abedules, pinares, campiñas arboladas...
- •Sólo cría en bosques montanos de coníferas.



 Come principalmente en árboles, a menudo con posturas acrobáticas.
 Extrae semillas de las piñas de aliso.

ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO ARBOLADOS)

AVES RESIDENTES

Águila real (Aquila chrysaetos)

- •Medidas: 80-90 cm de longitud.
- •Muy grande y oscura.
- Cola larga y redondeada.
- •Anida principalmente en rocas.
- •Come conejos, liebres, aves, reptiles y carroña.
- ·Rara.





Su fuerza le permite transportar presas de considerable tamaño.

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

- •Medidas: 60-70 cm de longitud.
- •Grande y fuerte.
- Alas cortas y anchas.
- •Banda ancha oscura en el extremo de la cola.
- •Áreas accidentadas con riscos, hoces...
- Vulnerable.



La mayoría de las aves de presa mata con sus garras y no con el pico; éstas perforan órganos vitales y quiebran los huesos delgados.



Elanio azul (Elanus caeruleus)



Las aves rapaces poseen unos ojos grandes en relación a la cabeza y tienen gran concentración de células cónicas (conos) en la retina, todo esto les permite tener una vista excelente.

- •Medidas: 31-35 cm de longitud.
- Aspecto de paloma, cola corta y alas anchas y apuntadas.
- Áreas negras sobre las alas.
- Dehesas abiertas, cultivos, prados con árboles dispersos...
- Anida en árboles.
- •Caza roedores durante el crepúsculo.



Milano real (Milvus milvus)

- •Medidas: 61-66 cm de longitud.
- •Anida en árboles altos en comarcas llanas o montañosas con pinares, dehesas, sotos, bordes de bosques...
- Alimentación variada
- •Extinto como reproductor en Canarias



Cola bifurcada para hacer cambios repentinos de dirección durante el vuelo.



Ratonero (Buteo buteo)



- •Medidas: 50-55 cm de longitud.
- •Frecuentemente posado junto a la carretera
- •Bosques, dehesas, campiñas arboladas






Realiza vuelo planeado aprovechando las térmicas (columnas ascendentes de aire recalentando al contacto con el suelo)

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

- •Medidas: 40-45 cm de longitud.
- •Poderoso, compacto, de amplio pecho.
- Alas anchas y afiladas.
- •Caza mediante persecuciones o picados.
- •Anida en riscos, castillos, torretas de electricidad...
- Espacios abiertos y cultivados.
- •Caza palomas, estorninos, calandrias...
- Vulnerable.







Lechuza común (Tyto alba)



- Medidas: 35 cm de longitud.
- Sin "orejas".
- Disco facial acorazonado.
- •Uña del dedo medio con borde aserrado.
- •Caza a baja altura con vuelo lento, vacilante y muy silencioso.
- •Anida en campanarios, desvanes, graneros, cortados...
- •Egagrópilas grandes (4,6 x 2-2,5 cm)



También se llama Coruja, en algunas zonas de León.

Mochuelo europeo (Athene noctua)



- Medidas: 23 cm de longitud.
- Rechoncho, sin "orejas", cabeza grande y redondeada.
- Ojos amarillos.
- Vuelos bajos, ondulatorios.
- Cultivos, pastos, eriales...
- Anida en agujeros de árboles, taludes, muros de piedra...
- Come roedores, lagartijas, insectos...
- Muy común.



Las aves rapaces nocturnas pueden cazar pueden cazar de día pero ninguna diurna puede hacerlo de noche.

Mochuelo viene de "mocho" que quiere decir: sin cuernos.

Pito real (Picus viridis)

•Medidas: 32 cm de longitud.

•Verdoso, con obispillo dorado y píleo rojo.

•Bigotera roja con bordes negros en machos y negra entera en hembras.

Lengua muy larga.

Vuelo ondulatorio.

•Frecuente en el suelo comiendo hormigas.

•Desde bosques con claros hasta campiñas poco arboladas, a menudo en sotos, huertos, parques....

Taladra el nido en árboles.



En algunas zonas de León, se denomina Relinchón por su sonora voz audible a gran distancia similar al relinchar de un caballo.



Cuervo (Corvus corax)



- •Medidas: 60 cm de longitud.
- •El más grande de los córvidos del hemisferio norte.
- •En terrenos abiertos y forestales.



Es capaz de imitar el habla humana y de memorizar frases enteras.



Perdiz roja (Alectoris rufa)

- •Medidas: 30-34 cm de longitud.
- Apeona.
- Ocupa muchos tipos de hábitat
 y a muy diversa altitud
- Sedentaria
- •Se alimenta de semillas, hojas de gramíneas e insectos
- Se liberan para caza muchos ejemplares de granja



Prefiere correr a volar.



Faisán común (Phasianus colchicus)

- Medidas: 55-90 cm de longitud.
- •Escarban en el suelo.
- •Tarsos desnudos, con espolones.
- Alas cortas y redondeadas.
- •Pollos precoces.
- Muy cazadas.
- Introducidas.





Sisón común (Tetrax tetrax)



- •Medidas: 50-52 cm de longitud.
- Pequeña avutarda
- Alas "silban" al volar
- •Común, en declive






Avutarda común (Otis tarda)

- •Medidas: 75-100 cm de longitud.
- Pequeños bandos
- Sedentaria
- Vulnerable



Es el ave más pesada del mundo capaz de volar.





Alondra común (Alauda arvensis)



- •Medidas: 17-18 cm de longitud.
- •Muy gregaria en invierno
- A muy diversa altitud
- •Frecuente en invierno en rastrojos y barbechos
- •Colilarga



Nidifican en el suelo y las crías abandonan el nido antes de saber volar.

Totovía (Lullula arborea)

- Medidas: 15 cm de longitud.
- Cara rojiza.
- •Cola corta con puntas blancas.
- Pico fino.
- •Píleo eréctil.
- •Cola en vuelo o posada.
- •Pastizales secos y matorrales ralos, con arbolado, dehesas, claros y lindero de bosques, etc.





El grupo de las alondras es tan terrestre que la uña del dedo posterior es más largo que el propio dedo, para aumentar la superficie de sustentación.

Cogujada común (Galerida cristata)



- •Medidas: 18 cm de longitud.
- •Común
- •Corretea en los arcenes
- Ausencia de blanco al volar
- Poco gregaria
- Sedentaria



Es más regordeta y tiene el pico más largo que la alondra.

Calandria (Melanocorypha calandra)

- •Medidas: 19 cm de longitud.
- •Robusta, con un gran pico.
- Anida en agrupaciones.
- •Siembras, barbechos, pastizales secos... evita el matorral.
- Muy común.



Se distingue de otras alondras por la corbata negra.



Tarabilla común (Saxicola torquata)



- •Medidas: 12 cm de longitud.
- Caza desde posaderos al descubierto
- •Frecuentemente en parejas o familias
- Bordes de prados y matorrales





Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis)

- Medidas: 24 cm de longitud.
- •Muy frecuentemente posado en cables
- Vuelo fuerte ondulatorio
- Hasta hace poco subsp. del norteño



Más oscuro que el norteño, partes inferiores gris-rosáceo y menos borde blanco en las plumas escapulares.



Corneja (Corvus corone)



- Totalmente negra.
- Medidas: 47 cm de longitud.
- •Macho mayor que la hembra.
- •Frecuentemente junto a la carretera y sobre postes
- •A veces en pequeños grupos
- Sedentaria



Los córvidos poseen gran inteligencia.

Escribano montesino (Emberiza cia)

- •Medidas: 16 cm de longitud.
- Terrenos accidentados
- Montes y colinas a variable altitud
- Sedentario, con movimientos en altitud



Pico cónico, corto y grueso para pelar las semillas.



Escribano soteño (Emberiza cirlus)



- •Medidas: 16 cm de longitud.
- Obispillo pardo-grisáceo
- •Frecuentemente en pequeños bandos
- •Común



Mucho más pardo que el escribano cerillo.

Escribano cerillo (Emberiza citrinella)

- •Medidas: 16 cm de longitud.
- Obispillo rojizo
- •Gregario fuera de la cría
- En comarcas húmedas



Se introdujo en Nueva Zelanda en el s. XIX.



Triguero (Miliaria calandra)



- •Medidas: 18 cm de longitud.
- •En bandos.
- •Todo tipo de terrenos abiertos de llanura.



A veces vuela con las patas colgando.

Verdecillo (Serinus serinus)

- •Medidas: 11 cm de longitud.
- •Pequeño y verdoso, con obispillo amarillo.
- •Frente, lista superciliar y pecho amarillos.
- •Bordes y claros de bosques, sotos, jardines...



Pico corto y pequeño hecho para pelar semillas delicadas.



Verderón común (Carduelis chloris)



- •Medidas: 15 cm de longitud.
- •Verdoso con marcas amarillas en las alas y la cola.
- •Campiñas arboladas, sotos, jardines...



Se alimenta principalmente de semillas grandes, como las de acedera, mercurial, cedro y olmo.

Jilguero (Carduelis carduelis)

- •Medidas: 12 cm de longitud.
- •Alas negras con banda ancha amarilla.
- Obispillo blanco.
- •Vuela con amplias ondulaciones.
- •Campiñas arboladas, sotos...



Se alimenta principalmente de semillas de cardos.



ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO ARBOLADOS)

AVES ESTIVALES

Milano negro (Milvus migrans)

- •Medidas: 55-60 cm de longitud.
- •Nidos en árboles generalmente
- Alimentación oportunista
- Común, en aumento
- Cola menos ahorquillada que el milano real.







Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

- •Medidas: 40-45 cm de longitud.
- •Barras negras en las alas.
- •Estrias rojizas en el vientre del macho, que lo diferencian del aguilucho pálido.
- Existe un morfo oscuro.
- Campos de cereal, pastizales, brezales, tojales...
- •Come grandes insectos, reptiles, aves y pequeños mamíferos.
- Vulnerable.



Anidan en el suelo, siendo las máquinas cosechadoras de cereal una gran amenaza para ellos.



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



- •Medidas: 30 cm de longitud.
- •Dorso del macho color ladrillo sin motas negras.
- Uñas blancas.
- Campos de cereal.
- •Come ortópteros y otros grandes insectos.
- Vulnerable.



En algunos pueblos, consideraban a la hembra una especie distinta del macho, al cual creían producto de un cruce entre una paloma y la hembra.

Alcotán (Falco subbuteo)

- •Medidas: 30-35 cm de longitud.
- •Alas largas, posado sobrepasan la cola.
- •Calzas e infracoberteras caudales rojizas.
- •Terrenos abiertos con arboleda, bosquetes o bordes de bosques (pinares, encinares, sotos).
- •Come saltamontes, libélulas, vencejos, golondrinas, murciélagos...



Usa nidos de córvidos.





Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)



- •Medidas: 26 cm de longitud.
- •Linderos y claros de bosque con matorral (tojos, brezos, helechos...) o áreas abiertas con arbolado disperso.
- •Atrapa insectos en vuelo.
- ·Cría en el suelo.
- •Después de dos semanas, la hembra deja las crías a cargo del macho y hace una segunda puesta.

Permanece inmóvil durante el día bajo cualquier matorral y confían tanto en su camuflaje que casi se les pisa al caminar.



Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis)

- •Medidas: 32 cm de longitud.
- •Mayor que el chotacabras gris pero difícil de distinguir.
- •Semicollar rojizo y manchas claras en mejilla y garganta.
- Atrapa insectos en vuelo.
- Monte abierto, matorrales, cultivos arbolados o eriales.
- •Principalmente en comarcas cálidas.



Los chotacabras tienen unas plumas finísimas alrededor del pico para "palpar" los insectos voladores.



Codorniz común (Coturnix coturnix)



- •Medidas: 18-20 cm de longitud.
- Come semillas, hojas verdes, invertebrados
- Declive histórico, aunque actualmente estable
- •Especie cinegética



Es más común oírla que verla.

Tórtola europea (Streptopelia turtur)

- •Medidas: 26-29 cm de longitud.
- Frecuentemente en parejas o grupitos
- Baja altitud
- Visita girasoles, cereales
- Se encuentra en declive
- Vulnerable



Los músculos pectorales son un tercio de su peso y le permiten alcanzar 80km/h.



Abejaruco común (Merops apiaster)



- Medidas: 28 cm de longitud.
- Hembra más verde sobre alas y obispillo
- •Caza en el aire, frecuentemente en grupos
- Falta en bosques y altas montañas
- Nidos en taludes



Se alimenta, principalmente, de abejas y avispas, de donde proviene el nombre de esta especie.

Abubilla (Upupa epops)



- •Medidas: 27 cm de longitud.
- Come en el suelo
- •Necesita sitios de nido como árboles con agujeros, vallas de piedra, ruinas
- Abundante
- •Rara en el norte húmedo y montañas



Su nido huele mal porque las hembras y las crías segregan por la glándula uropigial un líquido de olor nauseabundo para defenderse de sus depredadores.

Cuco (Cuculus canorus)

- •Medidas: 34 cm de longitud.
- •Más oído que visto, se oye a gran distancia.
- •Terrenos arbolados o arbustivos, campiñas con bosquetes.
- •Los padres migran hacia bosques ecuatoriales en julio, después de realizar la puesta. Mientras que los jóvenes se marchan en septiembre sin ser guiados por sus padres biológicos, a los que no conocieron nunca.



Su canto es característico, de donde le viene su nombre, que es muy similar en las distintas lenguas.

☼ La hembra vigila nidos en construcción, y cuando observa el comienzo de la puesta ajena aprovecha el momento en el que los propietarios están ausentes para poner un huevo en el nido elegido, en intervalos de 48 horas, el Cuco hembra pone de 12 a 13 huevos en otros tantos nidos, apartando de cada uno de ellos un huevo para mantener el mismo número aprovechándose principalmente de: Chochines, Petirrojos, Lavanderas.

El huevo del Cuco eclosiona antes que los otros huevos del nido (en 11 días, el período de incubación más corto de todas las aves) y nada más salir del huevo, empuja a los otros huevos hasta echarlos fuera del nido.



Críalo (Clamator glandarius)



- Medidas: 38 cm de longitud.
- Cola muy larga.
- •Campiñas mediterráneas con núcleos de arbolado.
- Parasita nidos de córvidos.
- Come orugas.



La cría no expulsa del nido a sus "hermanos" pero llega ser tan atractivo (ya que crece mucho más rápido) para sus padres adoptivos, que estos le atienden más que a sus verdaderos hijos, con el consiguiente perjuicio para ellos.

Bisbita campestre (Anthus campestris)



- Medidas: 17 cm de longitud.
- Cabeza con destacadas lista superciliar, loral, bigotera (corta) y malar (larga y fina)
- •Juveniles con motas en pecho y vientre



Las bisbitas son de la misma familia que las lavanderas.

Lavandera boyera (Motacilla flava)



Amarillo más intenso que en la lavandera cascadeña.

- Medidas: 17 cm de longitud.
- Más compacta y colicorta que las otras lavanderas
- Dormideros en carrizales





Collalba gris (Oenanthe oenanthe)



- •Medidas: 15 cm de longitud.
- Caza desde perchas bajas o correteando
- Anida en piedras, muros o matas bajas



Las collalbas se caracterizan por tener una T negra invertida en la cola, que se ve cuando agitan la cola y durante el vuelo.

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- •La hembras tienen un color más leonado.
- •Canta desde posadero o en vuelo.



Pueden tener la garganta blanca (como en este caso) o negra.



Alcaudón común (Lanius senator)



- Medidas: 18 cm de longitud.
- Hembra con colores más parduzcos



Los alcaudones tienen la facilidad de imitar otros cantos.



Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)

- •Medidas: 17 cm de longitud.
- Común en el norte
- Hembra con colores más parduzcos



Durante la Edad Media, los alcaudones fueron adiestrados para la cetrería para damas caprichosas y sofisticadas.



ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO ARBOLADOS)

AVES INVERNANTES

Esmerejón (Falco columbarius)



- •Medidas: 25-30 cm de longitud.
- •A menudo en el suelo o sobre una piedra.
- •Tierras de labor, páramos, humedales...
- •Vuelo rápido casi a ras de suelo.
- Persigue pájaros con fiereza.
- •Caza alondras, bisbitas, pinzones...



Pasa fácilmente inadvertido.

Alcaudón real norteño (Lanius excubitor)

- •Medidas: 25 cm de longitud.
- •Más pálido que el alcaudón real meridional, sin tinte rosa en la parte inferior.






Lanius significa carnicero. Le viene dado por su costumbre de empalar a sus presas.



Búho campestre (Asio flammeus)



- Medidas: 37 cm de longitud.
- •Gruesas estrías en pecho. Vientre pálido
- •Caza de día en herbazales y zonas pantanosas.
- •Anida en el suelo en humedales, prados
- •Raro



También se llama Lechuza campestre.

Bisbita común (Anthus pratensis)

- •Medidas: 15 cm de longitud.
- •Tintes verdosos en plumaje otoñal
- Muy estriado en dorso, pecho y flancos
- En grupos
- •Corretea por el suelo entre la vegetación





ZONAS DE MATORRAL

AVES RESIDENTES



Aguilucho pálido (Circus cyaneus)

- •Medidas: 45-50 cm de longitud.
- Obispillo blanco.
- •Anida en matorrales (brezo, tojo...).
- •Come roedores y pájaros.



Tiene visión aguda y buena audición para ubicar animales pequeños que se esconden entre la vegetación.



Perdiz pardilla (Perdix perdix)



- •Medidas: 30 cm de longitud.
- Montañas del norte
- •1000 2000 m de altitud
- Escondidiza
- Sedentaria
- Vulnerable



El macho presenta un escudo negro en el pecho que la hembra no posee.

Acentor común (Prunella modularis)

- •Medidas: 14 cm de longitud.
- Matorrales no secos
- •Frecuentemente en media y alta montaña
- •Común



Son polígamos.



Pechiazul (Luscinia svecica)



- •Medidas: 14 cm de longitud.
- •La hembra tiene el pecho blanco bordeado de negro.
- Piornos, brezos...



Se puede ver en la parte alta de los matorrales.

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

- •Medidas: 13 cm de longitud.
- •Cola larga y alas cortas
- •Hembra parda por el dorso



Son difíciles de ver porque suelen encontrarse en la parte interior de los matorrales donde habitan.





Pardillo común (Carduelis cannabina)



- •Medidas: 13 cm de longitud.
- •Se encuentra en todo tipo de matorrales.
- •Se alimenta en pastizales, barbechos cultivos...
- A variable altitud
- Común y repartido






A veces se captura para jaulas.

ZONAS DE MATORRAL

AVES ESTIVALES



Zarcero común (Hippolais polyglotta)



- •Medidas: 13 cm de longitud.
- •Oliváceo y amarillo.
- •Arbustos altos (zarzales, setos espinosos, tarajales, sotos...).





Buitre leonado (*Gyps fulvus*)





- •Medidas: 95-105 cm de longitud.
- •Envergadura: 290 cm.
- Alas largas y anchas.
- Cola corta.
- •Planea con las alas en forma de V, con los "dedos" muy separados.
- Carroñero.
- •Sierras, cantiles, cortados, riscos, hoces...



Tienen mal olfato pero muy buena visión para detectar la comida desde gran altura.

Treparriscos (*Trichodroma muraria*)



- •Medidas: 16 cm de longitud.
- •Pico largo, fino y curvo.
- •Cola corta y en abanico.
- •Roquedos de alta montaña.
- Principalmente, calizas.
- Insectívoro.



Esta especie se ha especializado en buscar insectos en las grietas de los roquedos calizos.

Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

- •Medidas: 40 cm de longitud.
- Patas y picos rojos.
- •Negra con reflejos metálicos.
- Vuelos acrobáticos.
- •En cortados de roca.
- •Gregaria.
- Sedentaria.
- •Come en pastizales, matorral abierto o cultivos y barbechos.
- •Insectívora.
- Rara.





Chova piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*)



- •Medidas: 38 cm de longitud.
- Pico amarillo limón.
- Cola larga.
- Excelente voladora.
- •Cantiles en zona alpina.
- •Gregaria.
- Sedentaria.
- •Come en pastizales y pedreras.
- •Come, principalmente, invertebrados.





Alimoche común (Neophron percnopterus)





- Medidas: 60-65 cm de longitud.
- •También se denomina Alimoche egipcio.
- •Es el buitre más pequeño.
- •Cola en forma de cuña.
- •Jóvenes de color pardo.
- Planeador.
- ·Carroñero.
- Sierras y valles con cortados.
- •En Peligro.



Come también huevos de avestruz que casca dejando caer una piedra encima.

Roquero rojo (Monticola saxatilis)



•Medidas: 19 cm de longitud.

•Áreas rocosas con matorral claro o pastizal.

•Nidos bajo piedras o en muros.



Difíciles de observar por su conducta extremadamente huidiza.